

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek *DexaPico* ostrożnie.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
- Jeśli objawy nasiliły się lub nie ustąpią po kilku dniach, należy skontaktować się z lekarzem.
- Jeśli nasiliły się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Dexa PICO

Tiliae inflorescentiae extractum aquosum + Dextromethorphanum hydrobromidum
Syrop (1625 mg + 6,5 mg)/ 5 ml

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek *DexaPico* i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku *DexaPico*
3. Jak stosować lek *DexaPico*
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek *DexaPico*
6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK DEXAPICO I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

DexaPico jest syropem zawierającym w swoim składzie bromowodorek dekstrometorfanu oraz wyciąg z kwiatostanu lipy.

Dekstrometorfan jest środkiem przeciwkaszlowym. Jego działanie, utrzymujące się przez 6-8 godzin, polega na hamowaniu ośrodka kaszlu w ośrodkowym układzie nerwowym, dzięki czemu zmniejsza się częstotliwość ataków suchego kaszlu.

Wyciąg z kwiatostanów lipy łagodzi podrażnienia górnych dróg oddechowych wywołane kaszlem.

Wskazania do stosowania:

W stanach męczącego, suchego kaszlu różnego pochodzenia, niezwiązanego z zaleganiem wydzieliny w drogach oddechowych.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU DEXAPICO

Kiedy nie stosować leku *DexaPico*

Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na jego składniki, kaszlu z dużą ilością wydzieliny, astmy, ciężkich schorzeń wątroby, przy jednoczesnym przyjmowaniu inhibitorów monoaminooksydazy (MAO) i leków mukolitycznych (rozrzedzających śluz w drogach oddechowych).

Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat.

U dzieci od 2 do 12 lat stosować tylko w razie wyraźnej konieczności.

Należy zachować szczególną ostrożność stosując lek u osób z niewydolnością wątroby, zapaleniem oskrzeli, depresją układu oddechowego.

W przypadku prowadzonej kuracji chinidyną nie zaleca się stosowania, przed zastosowaniem leku należy zasięgnąć porady lekarza.

Produkt zawiera sacharozę (3,9 g w 5 ml syropu), należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Stosowanie leku *DexaPico* z innymi lekami

Nie zaleca się stosowania leku równocześnie z inhibitorami MAO ze względu na potęgowanie ich działania przez dekstrometorfan, co objawia się sennością, nudnościami, wysoką gorączką oraz podwyższeniem ciśnienia tętniczego krwi. Po odstawieniu inhibitorów MAO należy zachować odstęp czasowy 14 dni przed zastosowaniem leku.

Równoczesne podawanie leku z chinidyną może wpływać hamująco na metabolizm dekstrometorfanu w wątrobie, zwiększając jego stężenie w surowicy krwi.

Istnieje możliwość interakcji preparatu z lekami wpływającymi na układ dopaminergiczny w OUN.

W trakcie leczenia nie zaleca się spożywania alkoholu.

Stosowanie leku *DexaPico* z jedzeniem i pićm

Nie są znane interakcje pomiędzy lekiem *DexaPico* a składnikami żywności.

Ciąża i karmienie piersią

Nie stosować u kobiet w ciąży.

Nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Ze względu na możliwość wystąpienia senności należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK DEXAPICO

Doustnie.

- dzieci 2 - 6 lat: 3 razy dziennie 2,5 ml syropu

- dzieci 6 - 12 lat: 3 razy dziennie 5 ml syropu

- młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 3 razy dziennie 15 ml syropu

Nie przekraczać zalecanego dawkowania.

Jeśli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu leczniczego lub występują działania niepożądane niewymienione w ulotce, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku DexaPico

Może nastąpić pobudzenie, lekka ataksja (niezborność ruchów) i trudności w mówieniu. W razie znacznego przedawkowania może nastąpić zahamowanie czynności ośrodka oddechowego. W przypadku przedawkowania należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pominięcie zastosowania leku DexaPico

Pominięcie dawki leku nie ma istotnego wpływu na przebieg prowadzonej terapii. Należy kontynuować terapię z zachowaniem dotychczasowego dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku DexaPico

Produkt przeznaczony do stosowania w przypadku wystąpienia objawów. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

DexaPico, podobnie jak inne leki, może powodować działania niepożądane - sporadycznie mogą wystąpić: skórne reakcje alergiczne (świąd, pokrzywka), senność, zawroty głowy oraz objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak mdłości czy wymioty. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK DEXAPICO

Lek należy przechowywać w opakowaniu szczelnie zamkniętym, w temperaturze do 25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności umieszczonym na opakowaniu.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek DexaPico

100 g syropu zawiera:

Substancje czynne:

Wyciąg wodny z kwiatostanu lipy (1:5)	- 25,0 g
Dekstrometorfanu bromowodrek	- 0,1 g

Inne składniki leku to: sacharoza, zagęszczony sok aroniowy 65%, kwas cytrynowy jednowodny, sodu benzoesan, potasu sorbinian, aromat malinowy 7111, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek DexaPico i co zawiera opakowanie

Butelka ze szkła barwnego z zakrętką polietylenową zawierająca 115 ml syropu. Do opakowania dołączona jest miarka.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Nazwa:	„Herbapol-Lublin” S.A.
Adres:	ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin, Polska

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Nazwa:	„Herbapol-Lublin” S.A.
Adres:	ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin, Polska
Numer telefonu:	81 74 88 344

Data zatwierdzenia ulotki:

Lipiec 2011